

DENOMINAZIONE: PLAKKONTROL 15" COLLUTORIO ANTIPLACCA
trattamento intensivo
clorexidina 0,3% ad azione rapida

CONFEZIONE

- Flacone da 250ml per uso domiciliare – disponibile in Farmacia
- Flacone da 1 Litro per uso ambulatoriale – disponibile presso i migliori studi odontoiatrici

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, ALCOHOL, XYLITOL, GLYCERIN, SORBITOL, CHLOREXIDINE DIGLUCONATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, EUGENOL, MENTHA PIPERITA, ASPARTAME, ANETHOLE, METHYLPARABEN, AROMA, BENZYL ALCOHOL, ANISE ALCOHOL, LIMONENE, C.I. 42090, C.I. 19140.

Contiene una fonte di fenilalanina

PRINCIPIO ATTIVO

La **Clorexidina** è un disinfettante molto utilizzato in odontoiatria per la sua potente azione battericida e batteriostatica. E' un principio attivo in grado di disgregare la placca e di consentirne un efficace controllo chimico. **Plakkontrol 15" Collutorio Antiplacca** contiene Clorexidina allo 0,3%. E' clinicamente dimostrato che 10cc di prodotto con questa particolare concentrazione riescano, in soli 15 secondi di sciacquo, ad assicurare il raggiungimento della minima concentrazione inibitoria (MIC), che permette l'arresto della crescita della placca batterica per le dodici ore successive.

La rapidità del trattamento permette di ottenere un risultato sicuro, riducendo drasticamente gli eventuali effetti di pigmentazione legati all'uso della Clorexidina.

INDICAZIONI

Plakkontrol 15" Collutorio Antiplacca è un efficacissimo trattamento intensivo ad azione rapida, ed è consigliato

- nella profilassi antisettica pre e post chirurgica
- nella cura di disturbi gengivali
- nei portatori di impianti endossei, di protesi e di apparecchi ortodontici

Utilizzato come trattamento periodico ad intervalli di circa due mesi, aiuta a prevenire in modo ottimale l'insorgenza di disturbi del cavo orale di origine batterica.

E' un valido coadiuvante nel trattamento dei disturbi gengivali e nelle irritazioni della gola e delle mucose.

POSOLOGIA

Effettuare uno sciacquo ogni 12 ore per 15 secondi con 10 cc di prodotto puro (livello raso del cilindro filettato del tappo dosatore) ed espellere. Non risciacquare. Utilizzare fino ad esaurimento del flacone.

AVVERTENZE

Per risultati ottimali non assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti dopo ogni sciacquo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.